

Intégration

Exercice 1: Déterminer toutes les fonctions continues sur l'intervalle $[a, b]$ à valeurs complexes telles que

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| = \int_a^b |f(t)| dt.$$

Exercice 2: Calculer les intégrales suivantes :

$$\int_0^1 \arctan(\sqrt{1-x^2}) dx \quad \int_{-2}^0 \frac{\sqrt{-x(x+4)}}{x} dx.$$

Exercice 3: Nature de $\int_0^1 \frac{(\ln x)^2}{\sqrt{x}(1-x)} dx$.

Exercice 4: Nature de $\int_0^1 e^{\frac{1}{x}} dx$.

Exercice 5: Nature de l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2 + \cos \pi t} dt \quad ?$$

Exercice 6:

Discuter l'existence de $\int_{]0,1[} \frac{|\ln x|^\alpha}{(1-x)^\beta} dx$.

Exercice 7: Existence de l'intégrale $I_\alpha = \int_{]0,+\infty[} \frac{|\ln |1-x||^\alpha}{x^2} dx$.

Exercice 8: Convergence et calcul de

$$\int_0^1 \frac{t \ln t}{(1-t^2)^{\frac{3}{2}}} dt .$$

Indication : On pourra commencer par justifier l'intégrabilité puis faire le changement de variable $t = \sin \theta$.

Exercice 9: Existence et calcul de :

$$I = \int_{]-1,1[} \frac{dx}{(a-x)\sqrt{1-x^2}}.$$

Exercice 10: Soient a et b deux réels, $0 < a < b$. Montrer l'existence et calculer la valeur de l'intégrale :

$$I = \int_{\mathbb{R}^{**+}} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx.$$

Exercice 11: Donner un équivalent au voisinage de $+\infty$ de :

$$f(x) = \int_2^x \frac{1}{\ln t} dt.$$

Exercice 12:

On pose

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x \, dx, \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx$$

- 1) Existence ?
- 2) Comparer I et J .
- 3) Calculer I et J , en considérant $I + J$.

Exercice 13: Etudier l'existence de $\int_{]0, +\infty[} e^{-x|\sin x|} \, dx$.

Exercice 14:

Soit $f \in C([0, \infty[, \mathbb{C})$ telle que $\int_0^\infty f(x) \, dx$ converge. Montrer que $\int_0^\infty \frac{f(t)}{x+t} \, dt$ converge pour tout $x > 0$.

Exercice 15:

- 1) Que dire de l'intégrabilité de $\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$ sur $[0, 1[$.
- 2) Etudier la suite de terme général $u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2 - k^2}}$.

Exercice 16: Soit f une application continue de \mathbb{R}^+ vers \mathbb{R} telle que $\int_0^{+\infty} f^2(t) \, dt$ converge. On définit g par

$$g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) \, dt$$

si x est non nul.

- 1) Etudier la prolongeabilité de g à \mathbb{R}^+ . Calculer la dérivée de g .
- 2) Soit (a, b) avec $0 < a < b$
 - a) Prouver que

$$\int_a^b g^2(t) \, dt = ag^2(a) - bg^2(b) + 2 \int_a^b f(t)g(t) \, dt$$

- b) En déduire

$$\sqrt{\int_a^b g^2(t) \, dt} \leq \sqrt{\int_0^{+\infty} f^2(t) \, dt} + \sqrt{ag^2(a) + \int_0^\infty f^2(t) \, dt}$$

- c) Conclure quand à la convergence de $\int_0^{+\infty} g^2(t) \, dt$ et prouver l'inégalité :

$$\int_0^{+\infty} g^2(t) \, dt \leq 4 \int_0^{+\infty} f^2(t) \, dt.$$

Exercice 17: Soit f une fonction continue par morceaux sur $[0, 1]$, à valeurs dans \mathbb{R}^+ , non nulle en au moins un point où elle est continue. On pose $I_n = \int_0^1 f^n(t) \, dt$.

- 1) Montrer que pour n plus grand que 2 : $I_n I_{n-2} \geq I_{n-1}^2$.
- 2) En déduire que la suite $\left(\frac{I_{n+1}}{I_n}\right)_{n \geq 0}$ est convergente de limite non nulle.
- 3) En déduire que la suite $(I_n^{1/n})$ possède une limite lorsque n tend vers $+\infty$.

Indication : Se ramener au théorème de sommation des équivalents.

- 4) Déterminer cette limite lorsque f est continue.