

Durée : 4 heures

Cet énoncé de quatre pages est formé d'un problème en deux parties et de deux mini-problèmes.

## PROBLÈME

Mines 1989 M (Extrait)

Soit  $E$  l'ensemble des fonctions continues sur  $[0, 1]$ , à valeurs complexes. On définit, pour tout élément  $f$  de  $E$ , la norme uniforme notée  $\|\cdot\|_\infty$  où  $\|f\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |f(t)|$ .

On dit qu'un sous-espace vectoriel  $E'$  de  $E$  est dense dans  $E$  relativement à la norme  $\|\cdot\|_\infty$  si, pour tout élément  $f$  de  $E$ , il existe une suite  $(\varphi_n)$  d'éléments de  $E'$  telle que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f - \varphi_n\|_\infty = 0$ .

On note  $\mathcal{P}$  le sous-espace vectoriel de  $E$  constitué des fonctions polynomiales.

Pour tout  $\alpha \geq 0$ , on désigne par  $e_\alpha$  l'élément de  $E$  défini par  $e_\alpha(t) = t^\alpha$ .

## Partie A

Soit  $F$  l'espace des fonctions continues sur  $\mathbb{R}$ ,  $2\pi$ -périodiques, à valeurs complexes. Pour tout élément  $g$  de  $F$ , on définit la norme uniforme de  $g$  par  $\|g\|_\infty = \sup_{t \in \mathbb{R}} |g(t)|$ .

Pour tout entier naturel  $n$ , on note  $T_n$  le sous-espace vectoriel de  $F$  engendré par les fonctions  $t \mapsto e^{ikt}$ , où les nombres entiers  $k$  vérifient  $-n \leq k \leq n$ .

I.A.1 Soit  $\varphi_n$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $\varphi_n(t) = a_n \left( \cos \frac{t}{2} \right)^{2n}$ ,

le réel  $a_n$  étant tel que  $\int_{-\pi}^{\pi} \varphi_n(t) dt = 1$ .

(a) Montrer que  $\varphi_n$  est un élément de  $T_n$ .

(b) Prouver que, pour tout élément  $u$  de  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ,  $\cos^2 u \geq 1 - \sin u$ .

En déduire que, pour tout entier  $n$ ,  $\int_0^{\pi/2} (\cos u)^{2n+1} du \geq \frac{1}{n+1}$ , puis que  $a_n \leq \frac{n+1}{4}$ .

(c) Soit  $\delta$  un réel tel que  $0 < \delta < \pi$ ; montrer :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{\delta \leq t \leq \pi} \varphi_n(t) = 0$ .

I.A.2 Soit  $g$  un élément de  $F$ . Pour tout entier  $n \geq 0$ , on note  $Q_n$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par la relation :

$$Q_n(u) = \int_{-\pi}^{\pi} \varphi_n(t) g(u-t) dt.$$

(a) Établir la relation :

$$Q_n(u) = \int_{-\pi}^{\pi} \varphi_n(u-t) g(t) dt.$$

En déduire que  $Q_n$  appartient à  $T_n$ .

(b) Soit toujours  $\delta$  un réel tel que  $0 < \delta < \pi$  ; montrer l'inégalité :

$$|g(u) - Q_n(u)| \leq \sup_{|t| \leq \delta} |g(u) - g(u-t)| + 4\pi \|g\|_\infty \sup_{\delta \leq t \leq \pi} \varphi_n(t).$$

(c) En déduire que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|g - Q_n\|_\infty = 0$ .

(d) On suppose que  $g$  est une fonction paire ; montrer que  $Q_n$  est une fonction paire et en déduire qu'il existe un élément  $P_n$  de  $\mathcal{P}$ , de degré au plus égal à  $n$ , tel que  $Q_n(u) = P_n(\cos u)$ .

I.A.3 Soit  $f$  un élément de  $E$ . Prouver qu'il existe une suite  $(P_n)$  d'éléments de  $\mathcal{P}$  telle que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f - P_n\|_\infty = 0$ . On prolongera  $f$  en une fonction paire, notée  $\tilde{f}$ , et on introduira  $g(u) = \tilde{f}(\cos u)$ . En déduire que  $\mathcal{P}$  est dense dans  $E$  relativement à la norme uniforme  $\|\cdot\|_\infty$ .

## Partie B

I.B.1 On se propose de prouver que le sous-espace vectoriel  $W$  de  $E$  engendré par  $e_0, e_2, e_4, \dots, e_{2k}, \dots$  est également dense dans  $E$  relativement à la norme uniforme  $\|\cdot\|_\infty$ .

(a) Soit  $\psi$  la fonction définie sur  $[-1, 1]$  par  $\psi(u) = 1 - \sqrt{1-u}$ . Écrire le développement en série entière de  $\psi$  sur  $] -1, 1[ : 
$$\psi(u) = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n u^n.$$$

(b) Montrer que la suite  $(n^{3/2}b_n)$  admet une limite finie strictement positive lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$ . À cet effet, on posera  $c_n = \ln((n^{3/2}b_n))$  et on étudiera la série de terme général  $c_{n+1} - c_n$ . En déduire que la série de terme général  $b_n u^n$  converge uniformément sur  $[0, 1]$

(c) Prouver que  $e_1$  est limite d'une suite d'éléments de  $W$  pour la norme  $\|\cdot\|_\infty$ . On observera que, sur  $[0, 1]$ ,  $t = \sqrt{1 - (1 - t^2)}$ .

(d) En déduire que  $W$  est dense dans  $E$  relativement à la norme  $\|\cdot\|_\infty$ .

## FIN DU PROBLÈME

*PS : pour information, cet extrait représentait en gros la moitié de l'épreuve 1989. La deuxième moitié à été reprise, avec de légères modifications pour constituer une des épreuves du concours Mines-Ponts 2009.*

## Problème II

Centrale-Supélec 1998 MP développe le sujet de manière plus approfondie

Une fonction  $f$  définie sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$ , à valeurs réelles, est dite absolument monotone si et seulement si elle est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  et toutes ses dérivées sont positives sur  $I$ .

On se propose de démontrer qu'une fonction absolument monotone sur l'intervalle  $] -r, r[$  est développable en série entière, de rayon de convergence au moins égal à  $r$ .

II.1 Pour l'instant on suppose seulement  $f$  absolument monotone sur  $[0, r[$ .

(a) Ecrire la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre  $n$  pour  $f$  en 0 :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(f, x)$$

en exprimant  $R_n(f, x)$  sous la forme d'une intégrale.

(b) En déduire que pour  $x$  dans  $[0, r[$  la série  $\sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$  est convergente et que sa somme  $g(x)$  vérifie  $g(x) \leq f(x)$ . Vérifier de plus que pour tout  $x$  dans  $[0, r[$  la suite  $(R_n(f, x))_{n \geq 0}$  est bornée et positive.

(c) En ramenant l'intégrale  $R_n(f, x)$  à une intégrale sur  $[0, 1]$  par un changement de variable linéaire, montrer que la fonction  $x \mapsto \frac{1}{x^{n+1}} R_n(f, x)$  est croissante sur  $]0, r[$ , c'est-à-dire que si  $x$  et  $y$  sont tels que  $0 < x < y < r$  alors

$$0 \leq \frac{1}{x^{n+1}} R_n(f, x) \leq \frac{1}{y^{n+1}} R_n(f, y).$$

(d) En déduire que pour tout  $x$  de  $]0, r[$  la suite  $(R_n(f, x))_{n \geq 0}$  tend vers 0. Conclure.

II.2 On suppose maintenant que  $f$  est absolument monotone sur  $] -r, r[$ .

On définit deux fonctions  $g$  et  $h$  sur  $[0, r[$  par  $g(x) = f(x) + f(-x)$  et  $h(x) = f(x) - f(-x)$ .

(a) Montrer que  $g$  et  $h$  sont absolument monotones sur  $[0, r[$ .

(b) En déduire que  $f$  est développable en série entière sur  $] -r, r[$ .

II.3 On va appliquer ces résultats à la fonction  $\tan$ .

(a) Montrer que  $\tan$  est absolument monotone sur  $[0, \frac{\pi}{2}[$ .

*Indication* : On pourra montrer que  $\tan^{(n)} = P_n(\tan)$  où  $P_n$  est un polynôme.

(b) En déduire que  $\tan$  est développable en série entière sur  $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ .

(c) Quel est le rayon de convergence de cette série entière ?

Problème III

Exercice d'oral E.N.S. 2016

Soit  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction développable en série entière sur  $\mathbb{C}$ . On appelle ordre de  $f$  l'élément de  $[0, +\infty]$

$$\rho(f) = \inf \left\{ A \in \mathbb{R}^+; \exists r_0 \geq 0 \quad \forall r \geq r_0 \quad M(r) \leq e^{r^A} \right\}, \text{ où } M(r) = \sup_{z, |z|=r} |f(z)|.$$

(La borne inférieure de  $\emptyset$  vaut  $+\infty$ .)

III.1 Déterminer  $\rho(f)$  si  $f$  est polynomiale.

III.2 Soit  $q$  dans  $\mathbb{N}$ . construire  $f$  d'ordre  $q$ .

III.3 Donner  $f$  d'ordre  $+\infty$  (en justifiant bien que cette fonction est développable en série entière).

III.4 Quel est l'ordre de la fonction

$$\sin : z \mapsto \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

III.5 On note  $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$  le développement de  $f$  en série entière.

(a) Montrer que pour tout  $n$  et tout  $r > 0 : |a_n| \leq M(r)r^{-n}$ .

(b) *Attention! Question assez délicate.* On suppose  $\rho(f) > 0$  et tous les  $a_n$  non nuls, montrer que :

$$\frac{1}{\rho(f)} \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \left( -\frac{\ln |a_n|}{n \ln n} \right),$$

où pour une suite  $(u_n)_{n \geq 2}$  de nombres réels admettant au moins une valeur d'adhérence  $\liminf u_n$  désigne la plus petite de ses valeurs d'adhérence. On admettra pour l'instant que le nombre  $\ell = \liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n$  existe et est caractérisé par : pour tout  $\epsilon > 0$  il existe une infinité de  $n$  tels que  $u_n < \ell + \epsilon$  et il n'existe qu'un nombre fini de  $n$  tels que  $u_n < \ell - \epsilon$ .

III.6 (*Ajoutée par votre professeur pour éclaircir la notion de limite inférieure qui n'est pas au programme.*) On se propose de démontrer le résultat admis à la question précédente. Soit  $u = (u_n)_{n \geq 0}$  une suite de réels minorée.

(a) Montrer que si  $u = (u_n)_{n \geq 0}$  ne tend pas vers  $+\infty$  alors elle possède au moins une valeur d'adhérence, et réciproquement. Par convention on pose  $\liminf_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  si  $u$  tend vers  $+\infty$ .

On suppose dorénavant que  $u$  possède au moins une valeur d'adhérence et on note  $\mathcal{A}(u)$  l'ensemble de ses valeurs d'adhérence.

On définit la suite  $(v_n)_{n \geq 0}$  par  $v_n = \inf_{p \geq n} u_p$ .

(b) Montrer que la suite  $(v_n)_{n \geq 0}$  est croissante et majorée par tout élément de  $\mathcal{A}(u)$ .

(c) En déduire qu'elle converge. On note  $\ell$  sa limite.

(d) Montrer que  $\ell$  est dans  $\mathcal{A}(u)$ , qui possède donc un plus petit élément.  $\ell$  s'appelle la limite inférieure de la suite  $(u_n)_{n \geq 0}$ . On définirait de même la limite supérieure par  $\limsup_{n \rightarrow +\infty} u_n =$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{p \geq n} u_p \quad (\in \overline{\mathbb{R}}).$$

(e) Montrer que  $\ell$  est bien caractérisé par : pour tout  $\epsilon > 0$  il existe une infinité de  $n$  tels que  $u_n < \ell + \epsilon$  et il n'existe qu'un nombre fini de  $n$  tels que  $u_n < \ell - \epsilon$ .